

• měkká návnada • měkká návnada • měkká návnada • měkká návnada •

**CZ RATIMOR měkká návnada S PRÍCHUTÍ RYBY**

**Účinná látka:** 0,05g/kg antikoagulant bromadiolon, 99,995% atraktivního nástrahového materiálu.

Přípravek obsahuje hořké činidlo BITREX, které působí jako chutnový odpuzovač pro člověka. **Skupenství přípravku:** nástraha (RB) **Pozor!** Obsahuje antikoagulant bromadiolon! Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob. Zákaz používání přípravku ve volné přírodě tak, aby aplikace neohrozila volně žijící živočichy a životní prostředí. Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití!

**Návod na použití a dávkování:** Ratimor měkká návnada je balena v malých porézních sáčkích, které se neotvírají. Návnady umístíte do míst (hnízda, cestičky...), kde se pohybují myši a potkani. Ratimor měkkou návnadu používáme jako rodenticid ve skladištích se zemědělským provozem, ve vlnkých prostorách v okolí dřev a na starších podšl. zdi rod. domů, chat a sice pro: **Hubení červených potkanů (Rattus rattus), šedých potkanů (Rattus norvegicus) krys:** v množství odpovídajícím 2-10 sáčkům měkké návnady na několik míst (1 sáček = přibližně 10g) **Hubení myši domácí (Mus musculus):** v množství odpovídající 1-3 sáčkům měkké návnady na několik míst (1 sáček = přibližně 10g). Aplikované nástrahy kontrolovat a doplňovat v místech jejich odberu. Nástrahy umístit do nepřístupných míst pro děti, domácí zvířata... (nejlépe do trubek, staniček a podobných skrytých míst).

**Mechanismus účinku:** Bromadiolon patří mezi koagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cest a zasažení hladovec hyne vnitřním vykrvácením. RATIMOR působí již jednorázovým použitím nástrahy, je velmi dobře přijímaná a úhyn nastává mezi 3.-10 dnem po přijetí smrtelné (letální) dávky. Nástraha nevyvolává obranný reflex.

**Skládání přípravku:** přípravek se skládá v původních neporušených obalech na bezpečném místě (S53) odděleně od potravin, krmiv (S13), hnojiv a různých aromatických látek včetně pesticidů, aby nástrahy nepřejaly zápach, čímž by mohly ztratit svojí atraktivitu pro hladovce. Nástrahy chráňte před přímým slunečním světlem. Skladujte při teplotě 5 - 30 °C.

**Likvidace obalů:** prázdné obaly před likvidací znehodnoťte a pak likvidujte v komunálním odpadu. **Bezpečnostní opatření:** Při práci s nástrahou používejte ochranný oděr a gumové rukavice a boty. Při práci není dovoleno jíst, pít nebo kouřit. (S20/21). Po práci a před jdem se důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem.

**Příznaky otravy:** krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

**První pomoc: Při náhodném požití:** vypít 1/2 litru vlažné vody s 10 tablety medicínlého uhlí a dráždením hrdla vyvolat zvracení, nejdříve do 10 minut. **Při zasažení pokožky:** odstranit zasažené oděv, důkladně se omyt tekoucí vodou a mýdlem. **Při zasažení očí:** vyplachovat proudem čisté tekoucí vody po dobu 5 - 10 minut. **Při nadychnání prachu:** přerušit práci s informací o poskytnuté první pomoci. ANTI-DOTEM proti působení bromadiolonu je vitamín K1-Kanavit. Jeho dávku určí vždy lékař. Léčbu postiženého lze konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224919293, 224915402

RATIMOR je registrovaná ochranná známka firmy UNICHEM d.o.o.

**Výrobce:** UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, tel.: +386 1 7558 150, www.unichem.si

**Dovozce:** UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, tel.: +420 257326556,

e-mail: unichem\_agro\_cz@volny.cz

**S vety:** S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S46 P i použití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

**Použitelnost do:** **Číslo výrobní sarže:** **Na základě posouzení ÚSKVBL je přípravek schválen pro použití v potravinářských provezech bez připominek.**


**Účinné i na hrabošovitě hladovce v komunální sféře.**

Obsah: 5 kg



# RATIMOR®

**Požerová nástraha k jednorázovému hubení potkanů, krys, myši domácích a na hrabošovitě hladovce v komunální sféře.**



**5 kg**

**SK RATIMOR mäkká návnada S PRÍCHUTŮ RYBY**

**Účinná látka:** 0,05g/kg antikoagulant bromadiolon. Přípravek obsahuje hořké činidlo BITREX, které působí ako chutový odpuzovač pre človeka.

**Skupenstvo prípravku:** návnada (RB) **Pozor!** Obsahuje toxický antikoagulant bromadiolon! Uchovávaťe mimo dosah detí a nepoučených osôb. Nepoužívajte prípravok vo voľnej prírode. Aplikujte tak, aby ste neohrozili voľne žijúce druhy a životné prostredie. Prípravok nesmie byť použitý inak, ako je uvedené v návode na použitie.

**Návod na použitie/dávkovanie:** Ratimor mäkká návnada je balená v malých poréznych sáčkoch, ktoré sa neotvárajú. Návnady umiestnite do miest (hniezda, cestičky...), kde sa pohybujú myši a potkany. Ratimor mäkkú návnadu používame ako rodenticid v skladištách s poľnohospodárskou prevádzkou na hubenie **červených potkanov, sivých potkanov, krys:** v množstve zodpovedajúcom 2-10 sáčkom (1 sáček = približne 10g) na niekoľko miest, **hubenie myši domácej** v množstve zodpovedajúcom 1-3 sáčkom (1 sáček = približne 10g) na niekoľko miest. Aplikované nástrahy kontrolovať a doplňovať v miestach ich odberu. Nástrahy umiestniť do neprístupných miest pre deti, domáce zvieratá... (najlepšie do trubiek a podobných skrytých miest). Mechanizmus účinku: Bromadiolon patrí medzi koagulačné jedy. Po požití znižuje srážalivost krvi a zvyšuje priepustnosť krvných ciev a zasahtnúť hladovce hyne na vnútorné krvácanie. Ratimor pôsobí už po jednorázovom požití nástrahy, je veľmi dobre prijímaná a úhyn nastáva medzi 3.-10. dňom po prijatí smrtočnej, letálnej dávky. Nástraha nevyvoláva obranný reflex.

**Skládovanie prípravku:** prípravek sa skladuje v pôvodných neporušených obaloch na bezpečnom mieste oddelene od potravín, krmív, hnojív a rôznych aromatických látok vrátane pesticidov, aby nástrahy neprebrali zápach, čím by mohli stratiť svoju atraktivitu pre hladovce. Nástrahy chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkom. Skladujte pri teplote 5-30 °C.

**Likvidácia obalov:** prázdné obaly pred likvidáciou znehodnoťte a potom likvidujte v komunálnom odpade.

**Bezpečnostné opatrenia:** pri práci s nástrahou používaťe ochranný oděv a gumové rukavice a topánky. Pri práci nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť. Po práci a pred jedlom sa dôkladne umyte teplou vodou a mýdlom.

**Príznaky otravy:** krátke po použití nevoľnosť a zvracanie. Po niekoľkých hodinách až dňoch krvácanie do pokožky a sliznic, tvorba modrín, močenie krvi, krvavá stolica, krvácanie z nosa a dásien.

**Prvá pomoc: Po požití prípravku:** vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0,3 l vlažnej vody a nevyvolávejte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. **Pri zasahtnutí pokožky:** odstráňte zasahtnúť oděv, dôkladne sa umyte tečúcou vodou a mýdlom. **Pri zasahtnutí očí:** vyplachovať prúdom tečúcej čistej vody po dobu 5 minút. **Pri nadychnaní prachu:** prerušíť prácu, vyvíesť postýhnutého na vzduchu. Lekára informovať o poskytnutej prvej pomoci. Antidotom proti působení bromadiolonu je vitamín K. Jeho dávku určí vždy lékař. Léčbu postýhnutého je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: +421 2 54 77 41 66, fax: +421 2 54 77 46 05.

RATIMOR je registrovaná ochranná známka firmy UNICHEM d.o.o.

**S vety:** S2 Uchovávaťe mimo dosahu detí. S13 Uchovávaťe mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S36/37 Noste vhodný ochranný oděv a rukavice. S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukažte tento obal alebo označenie. S61 Zabraňte uvolneniu do životného prostredia. Obzobnaťte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

**Regis. č. CCHLP bio/251 /B/05/7/CCHLP »Používajte biocídne výrobky bezpečne«**

**Výrobca:** UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika,

tel.: +386 1 7558 150, www.unichem.si

**Dovozca:** UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha,

tel.: +420 257326556,

e-mail: unichem\_agro\_cz@volny.cz

**Použitelné do:**

**Číslo sarže:**

**Obsah:** 5 kg

31016

