

Insekticid w formie aerozolu ULV przeznaczony do walki z leżącym (śwaby) i latającym (muchy, komary) wewnątrz budynków, w pomieszczeniach i biurach, w pomieszczeniach gastronomicznych, restauracjach, sklepach, w miejscach publicznych.

AKTYWNE LĄCZNIKI

5-[(2-butoxyetoxy)etokymetyl]-6-propyl-1,3-benzodioxol (piperonylbutoksid) - 187,5 g/l (CAS: 51-03-6), 3-fenoksybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimetylocyklopropánkarboxylát (permetrin) - 125 g/l (CAS: 52645-53-1), Tetrametrin - 50 g/l (CAS: 7696-12-0)

WYSTRĄŻNE UPOZORNENIA

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba pod tlakom: pri zahriatí môže vybuchnúť. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Podозoreníe, že spôsobuje rakovinu. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím si prečítajte špeciálne bezpečnostné pokyny. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Neľajte. Zabráňte vdychovaniu hmly. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Chránite pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám presahujúcim 50 °C/122 °F.

NEBEZPEČENSTVO



UFI: MR40-SOPJ-G005-6N5H

DRŽITEL REGISTRÁCIE:

ICB Pharma Tomasz Świątosławski, Paweł Świątosławski
Spółka Jawna, Ul. Moździerzowców 6a, 43-602 Jaworzno
+48 32 745 47 00

DISTRIBÚTOR:

DDD Servis Slovakia, s.r.o., Švermova 31,
038 61 Vrútky, č. tel. 043-4285125

DÁTUM SPOTREBY:

3 roky od dátumu výroby

REGISTRAČNÉ ČÍSLO CCHLP:

bio/435/D/15/CCHLP

Dátum výroby a číslo šarže uvedené na obale.

REV-305-202405-1-2-1

PRÍPRAVOK NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

NOVÝ

Bifent®
FOGGER PLUS

INSEKTICID
VO FORME AEROSÓLU ULV URČENÝ
NA BOJ PROTI LEŽÚCEMU A LIETAJÚCEMU
HMYZU VO VNÚTRI BUDOV



OBJEM
100 ml



500 m³



88mm

165 mm

ROZSAH POUŽITIA

Ležúci hmyz, ako sú śwaby a lietajúci hmyz, ako sú muchy a komare.

JEDNA AEROSÓLOVÁ NÁDOBA OBSAHUJE 10 ML
TEKUTINY S VYŠŠIE UVEDENÝM ZLOŽENÍM A 90 ML HNACIEHO PLYNU

ODPORUČANÉ KONCENTRÁCIE, DÁVKY A NÁVOD NA POUŽITIE:

Balenie s objemom 100 ml funguje efektívne v priestore 500 m³. 1 sekunda aplikácie uvoľní 1,4 g účinného produktu o objeme 12 m³. Vypočítajte objem miestnosti a čas aplikácie pre aplikáciu minimálnej účinnej dávky produktu. Napr. v miestnosti s rozmermi 5 x 5 x 2,5 m s objemom 62,5 m³ stačí aplikovať produkt počas 5,2 sekundy. Prípravok začína účinkovať po 5 minútach od aplikácie a plnú účinnosť dosiahne po 24 hodinách.

Pred aplikáciou zabezpečte aby bol ošetrovaný priestor bez prítomnosti ľudí, zvierat, akvárií, kuchynského a stolového riadu, jedla a prikrýte povrchy, ktoré sú určené na uchovávanie potravín atď., zabezpečte pitnú vodu pred kontamináciou. Miestnosť uzavrite, v prípade klimatizovaných izieb vypnite klimatizáciu. Vypnite elektrické zariadenia a odstráňte zdroj otvoreného ohňa. Aerosól umiestnite na podlahe v strede miestnosti. Pod nádobu vložte kartón alebo noviny. Nádobu neumiestňujte priamo na zem. Nepoužívajte prípravok vo vnútri skriní, pod nábytkom (napr. pod stolom) atď. NEĽAJČITE!

ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

POZOR! Nádoba pod tlakom. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 50 °C. Neprepichujte nádobu a nespájajte ju ani po jej vyprázdnení. Neľajte. Nestriekajte na otvorený oheň ani na iné žeravé materiály. Neprepichujte ani nehádzajte nádobu do ohňa – ani po celkovom spotrebovaní. Obsahuje 60% hmotnostných vysoko horľavých plynov. Skladujte na suchom a vetranom mieste mimo dosahu detí.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

PRIPRAVOK/OBAL: Odovzdajte na likvidáciu spracovateľovi, ktorý je oprávnený zberať, prepravovať, zhromažďovať a likvidovať odpad (nebezpečný odpad).

OBSAHUJE: Permetrin, tetrametrin, piperonylbutoksid (PBO), uhľovodíky C3-4

AKTIVÁCIA AEROSÓLU

1. Vystrite ruku s nádobou na dĺžku ramena tak, aby tryska smerovala od tváre (prípravok sa uvoľňuje z trysky zvislo nahor).
2. Otočte aktivátor vpravo o 180° a pridržte ho počas aplikácie prípravku podľa vypočítaného objemu tak dlho, ako je to potrebné na uvoľnenie príslušnej dávky. Potom zastavte uvoľňovanie otočením aktivátora a opustite miestnosť.
3. V prípade „plnej dávky“ otočte aktivátor vpravo o 180° a nechajte ho úplne uvoľniť. Nádobu držte čo najďalej od tváre a postavte ju do zvislej polohy a opustite miestnosť, v ktorej sa vykonáva tento postup. Nechajte miestnosť uzavretú asi na 4 hodiny. Po uplynutí tejto doby otvorte dvere a okná a miestnosť vyvetrajte asi 1 hodinu. **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI ZAOBCHÁDZANÍ S PRODUKTOM** – Uchovávajte mimo dosahu vysokých teplôt, zdrojov zapálenia a otvoreného ohňa.


PRIAME A NEPRIAME VEDĽAJŠIE ÚČINKY POUŽITIA:

Akútne príznaky – výrobok môže spôsobiť miestne podráždenie spojiviek a ich sčervenanie, slzenie.
Oneskorené príznaky – môžu spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

PRVÁ POMOC | Pri zasiahnutí pokožky: Vyčistite všetok kontaminovaný odev. Pokožku opláchnite vodou a potom vodou s mydlom. Ak pretrvávajú príznaky podráždenia alebo senzibilizácie kontaktujte lekára. Kontaminovaný odev operte pred opakovaným použitím.

Pri zasiahnutí očí: Umývajte vhodnou tekutinou na umývanie očí alebo čistou vodou tak, že budete udržiavať viečka otvorené najmenej 10 minút, vyhľadajte lekársku pomoc. **Pri nadýchnutí:** Vывedte postihnutú osobu z miesta expozície, uložte ju do komfortnej polohy, ak problémy s dýchaním pretrvávajú zaistite jej prístup čerstvého vzduchu a okamžite vyhľadajte lekára.

V prípade požitia: Vypláchnite ústa dôkladne vodou (nedávajte poškodenej osobe piť mlieko, olej alebo alkohol), v prípade zhoršenia zdravia okamžite kontaktujte lekára. **POZOR!** Tuhy, jedlé oleje a alkohol môžu zvyšovať absorpciu aktívnych látok. Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom na tel. čísle: + 421 2 54774 166



88mm