

BRODITOP[®] PASTA



15 g

BRODIFACOUM 0,005% + DENATONIUM BENZOÁT 0,001%

BRODITOP[®] PASTA

Požerová nástraha vo forme priehľadných vreciek z filtračného papiera s obsahom 15g mredzej pasty určená na priame použitie ako rodenticid. Prípravok je vhodný pre profesionálne hubenie škodlivých hlodavcov (potkan obyčajný - *Rattus norvegicus*, myš domáca - *Mus musculus*) v bytových i nebytových priestoroch a ich bezprostrednej blízkosti, v pivniaciach, poväčšinou, potravinárskych a poľnohospodárskych prevádzkach, chovoch hospodárskych zvierat at. Čas potrebný na biocídny účinok: 3-5 dní.

Zloženie | brodifacoum 0,005% (tj. 50 mg.kg⁻¹) | CAS číslo 56073-10-0, ES číslo 259-980-5

P102: Uchovávať mimo dosahu detí. P103: Pred použitím si prečítajte etiketu. P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P280: Noste ochranné rukavice. P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P301+P310: Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405: Uchovávať uzamknutú.

Spôsob použitia

Pred zahájením vlastnej deratizácie vykonajte dokonalú prehliadku oblasti so zameraním na druhové určenie hlodavcov, úroveň i intenzitu zamorenia. Skontrolujte možné prístupové cesty, odstráňte všetky zdroje vody a potraviny. S ohľadom na prítomnosť čerstvého trusu a ďalších stop pohybu hlodavcov špecifikujte najvhodnejšie miesta pokladky nástrahy. V prípade, že chcete minimalizovať použitie rodenticídnych nástrah (napr. pri eliminácii hlodavcov v potravinárskych prevádzkach alebo v chovoch zvierat), odporúčame preferovať netoxické metódy likvidácie. Nástrahu kladíme do miest, kde je viditeľná činnosť hlodavcov (čerstvý trus, zvyšky potraviny, v blízkosti alebo vo vnútri nór ap.) pomocou komerčne dostupných deratizačných staníc. Ak nie sú deratizačné stanice k dispozícii, odporúčame z dôvodov ochrany necieľových organizmov (domáce zvieratá, vtáky, popr. malé deti) a ochrany pred vlhkosťou použiť aspoň napr. kusy drenážneho potrubia alebo papierové tácky či iné podložky. Z dôvodu nutnosti prekrytia ľudského pachu je vhodné pri manipulácii s nástrahou použiť gumové alebo PVC rukavice.

Deratizačné stanice alebo miesta pokladky musia byť viditeľne označené informáciami o tom, že obsahujú látku na hubenie hlodavcov a že sa stanice nesmú otvárať ani s nimi manipulovať.

Aplikačná dávka:

V prípade myši: Kladíme v množstve až 50g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť jednotlivých miest pokladky nástrahy sa pohybuje od 5 metrov (optimálna vzdialenosť) do 2 metrov (vysoký stupeň zamorenia).

V prípade potkanov: Kladíme v množstve až 90 g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť jednotlivých miest pokladky nástrahy sa pohybuje od 10 metrov (optimálna vzdialenosť) do 2 metrov 5 (vysoký stupeň zamorenia). Starú (znečistenú, ohryznú) nástrahu je nutné priebežne nahrádzať novou (odporúčame vykonávať kontrolu každý 3.-4. deň). V prípade, že niektoré miesta s nástrahou zostávajú nedotknuté, odporúčame zmeniť ich umiestnenie. Ak nachádzame uhynuté hlodavce, je nutné ich zozbierať a zlikvidovať podľa predpisov.

Vždy dbajte na znečistenie prístupu necieľových zvierat, popr. i detí. Ak už nedochádza k úbytku nástrahy, je možné považovať deratizáciu za ukončenú.

Nespotrebované zvyšky nástrahy je treba odstrániť. Aby sa obmedzilo riziko návratu hlodavcov, je nutné udržiavať všetky miesta v čistote a bez výskytu zvyškov potraviny.

Ďalšie špecifické podmienky: Prípravok nesmie byť použitý inak, než ako je uvedené v návode na použitie! Zabráňte detom, vtákom a necieľovým živočíchom (predovšetkým psovm, mačkám, ošipánym a hydine) v prístupe k nástraha. V prípade podozrenia na konzumáciu prípravku domácim zvieratkom, vyhľadajte veterinára a ukážte mu etiketu (štítok, kartu bezpečnostných údajov). Zabezpečte, aby nástraha nemohla byť odvečená mimo miesto pokladky. Prípravok sa nesmie používať na miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu s povrchom potravín alebo krmív, kuchynského náčinia či ich kontaminácii. Nesmie byť použitý vo voľnej prírode. Nepoužívajte antikoagulačné rodenticidy ako trvalé nástrahy, doba ich použitia by nemala prekročiť dobu 35 dní.

Vlastnosti a mechanizmus účinku

BRODITOP[®] je antikoagulačný rodenticid určený na priame použitie. Pre cieľového jedinca je smrteľná jediná dávka. Znižuje zrážanlivosť krvi, čo vedie k vonkajšiemu a vnútornému krvácaniu a následne k uhynutiu. Cieľové zvieratá sú prilákané ochucovacími obsahovými v nástraha a hynú počas troch až piatich dní po konzumácii bez výrazných klinických príznakov, ktoré by vyvolali podozrenie u ostatných členov kolónie. BRODITOP[®] obsahuje horké ochucovadlo (denatonium benzoát), ktoré výrazne znižuje riziko konzumácie deťmi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Noste vhodné ochranné rukavice. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte v dobre vetranych priestoroch. Po práci si umyte nezakryté časti tela vodou a mydlom. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Ak je prípravok používaný vo verejných priestoroch, je nutné ošetrovať plochy výrazne označiť informáciou a použiť antikoagulačných rodenticidov.

Prvá pomoc

V prípade podozrenia na otravu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

po požití - starostlivo vypláchnuť ústa vodou. Nevypúvať zvracanie, ak je postihnutý v

bezvedomí. Vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Lekáriovi odovzdať obal od prípravku, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov.

pri kontakte s pokožkou - zasiahnuté miesto dôkladne umyť mydlom a vodou.

pri nadýchnutí - postihnutého dopraviť na čerstvý vzduch. Pokiaľ sa postihnutý necíti dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

pri zasiahnutí očí - vyplachovať najmenej 15 minút čistou vodou i pod viečkami.

Príznaky otravy: Brodifacoum je nepriamy antikoagulant, pôsobí ako inhibítor vitamínu K1, vyvoláva krvácanie z nosa a ďasien, tvorbu zrazenín v koži, podkoží a na slizniciach, celkovú slabosť, prípadne šok.

Informácia pre lekárov: V prípade konzumácie väčšieho množstva produktu sa odporúča vyvolať zvracanie, vyplach žalúdka a kontrola aktivity protrombinu nie menej ako 18 hodín po požití. V prípade vyšších hodnôt sa odporúča podať vitamín K1. Antikoagulanty sú kontrindicované. Špecifický protijed: Vitamín K1 (Kanavit). V prípade potreby kontaktovať príslušné toxikologické informačné centrum: Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Déřera, Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. číslo : 02-547 74 166.

Skladovanie

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchu mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Uchovávať na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia obalov a zvyškov

Obaly od prípravku sa nesmú znova používať ak akýmkolvek účelom! Prázdne obaly môžu byť odoslané na skládku alebo na recykláciu až po vyčistení, ak sa koná v súlade s miestnymi a národnými predpismi. Zvyšky prípravku musia byť likvidované podľa zákona. Odpad zatriedte podľa kategórie odpadov. Zabráňte kontaminácii povrchových i podzemných vôd ako samotným prípravkom, tak aj vyprázdnenými obalmi. Zabráňte kontaminácii potravín, nápojov a krmív.

Doba použiteľnosti

Pri správnom spôsobe skladovania v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby

Dátum výroby a číslo šarže:

Výrobca prípravku: ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Taliansko, telefón +39/049/9597785 - www.zapiexpert.com - info@zapiexpert.com

Distribútor: DDD Servis

Slovenská, s.r.o., Svermova 31, 038 61 Vrútky, tel. +421 43-4284381, fax. +421 43-428 5125, e-mail: dddservis@dddservis.sk - www.dddservis.sk

Registračné číslo: SK15-MRP-006-376/14

Broditop[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Zapi



067106DD05-03



Balenie: **2,5kg**

BRODITOP[®] PASTA



15 g

BRODIFACOUM 0,005% + DENATONIUM BENZOÁT 0,001%

BRODITOP[®] PASTA

Požerová nástraha vo forme priehľadných vreciek z filtračného papiera s obsahom 15g mredzej pasty určená na priame použitie ako rodenticid. Prípravok je vhodný pre profesionálne hubenie škodlivých hlodavcov (potkan obyčajný - *Rattus norvegicus*, myš domáca - *Mus musculus*) v bytových i nebytových priestoroch a ich bezprostrednej blízkosti, v pivniaciach, poväčšinou, potravinárskych a poľnohospodárskych prevádzkach, chovoch hospodárskych zvierat at. Čas potrebný na biocídny účinok: 3-5 dní.

Zloženie | brodifacoum 0,005% (tj. 50 mg.kg⁻¹) | CAS číslo 56073-10-0, ES číslo 259-980-5

P102: Uchovávať mimo dosahu detí. P103: Pred použitím si prečítajte etiketu. P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P280: Noste ochranné rukavice. P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P301+P310: Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405: Uchovávať uzamknutú.

Spôsob použitia

Pred zahájením vlastnej deratizácie vykonajte dokonalú prehliadku oblasti so zameraním na druhové určenie hlodavcov, úroveň i intenzitu zamorenia. Skontrolujte možné prístupové cesty, odstráňte všetky zdroje vody a potraviny. S ohľadom na prítomnosť čerstvého trusu a ďalších stop pohybu hlodavcov špecifikujte najvhodnejšie miesta pokladky nástrahy. V prípade, že chcete minimalizovať použitie rodenticídnych nástrah (napr. pri eliminácii hlodavcov v potravinárskych prevádzkach alebo v chovoch zvierat), odporúčame preferovať netoxické metódy likvidácie. Nástrahu kladíme do miest, kde je viditeľná činnosť hlodavcov (čerstvý trus, zvyšky potraviny, v blízkosti alebo vo vnútri nór ap.) pomocou komerčne dostupných deratizačných staníc. Ak nie sú deratizačné stanice k dispozícii, odporúčame z dôvodov ochrany necieľových organizmov (domáce zvieratá, vtáky, popr. malé deti) a ochrany pred vlhkosťou použiť aspoň napr. kusy drenážneho potrubia alebo papierové tácky či iné podložky. Z dôvodu nutnosti prekrytia ľudského pachu je vhodné pri manipulácii s nástrahou použiť gumové alebo PVC rukavice.

Deratizačné stanice alebo miesta pokladky musia byť viditeľne označené informáciami o tom, že obsahujú látku na hubenie hlodavcov a že sa stanice nesmú otvárať ani s nimi manipulovať.

Aplikačná dávka:

V prípade myši: Kladíme v množstve až 50g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť jednotlivých miest pokladky nástrahy sa pohybuje od 5 metrov (optimálna vzdialenosť) do 2 metrov 2 (vysoký stupeň zamorenia).

V prípade potkanov: Kladíme v množstve až 90 g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť jednotlivých miest pokladky nástrahy sa pohybuje od 10 metrov (optimálna vzdialenosť) do 2 metrov 5 (vysoký stupeň zamorenia). Starú (znečistenú, ohryznú) nástrahu je nutné priebežne nahrádzať novou (odporúčame vykonávať kontrolu každý 3.-4. deň). V prípade, že niektoré miesta s nástrahou zostávajú nedotknuté, odporúčame zmeniť ich umiestnenie. Ak nachádzame uhynuté hlodavce, je nutné ich zozbierať a zlikvidovať podľa predpisov.

Vždy dbajte na znečistenie prístupu necieľových zvierat, popr. i detí. Ak už nedochádza k úbytku nástrahy, je možné považovať deratizáciu za ukončenú.

Nespotrebované zvyšky nástrahy je treba odstrániť. Aby sa obmedzilo riziko návratu hlodavcov, je nutné udržiavať všetky miesta v čistote a bez výskytu zvyškov potraviny.

Ďalšie špecifické podmienky: Prípravok nesmie byť použitý inak, než ako je uvedené v návode na použitie! Zabráňte detom, vtákom a necieľovým živočíchom (predovšetkým psovm, mačkám, ošipánym a hydine) v prístupe k nástraha. V prípade podozrenia na konzumáciu prípravku domácim zvieratkom, vyhľadajte veterinára a ukážte mu etiketu (štítok, kartu bezpečnostných údajov). Zabezpečte, aby nástraha nemohla byť odvečená mimo miesto pokladky. Prípravok sa nesmie používať na miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu s povrchom potravín alebo krmív, kuchynského náčinia či ich kontaminácii. Nesmie byť použitý vo voľnej prírode. Nepoužívajte antikoagulačné rodenticidy ako trvalé nástrahy, doba ich použitia by nemala prekročiť dobu 35 dní.

Vlastnosti a mechanizmus účinku

BRODITOP[®] je antikoagulačný rodenticid určený na priame použitie. Pre cieľového jedinca je smrteľná jediná dávka. Znižuje zrážanlivosť krvi, čo vedie k vonkajšiemu a vnútornému krvácaniu a následne k uhynutiu. Cieľové zvieratá sú prilákané ochucovacími obsahovými v nástraha a hynú počas troch až piatich dní po konzumácii bez výrazných klinických príznakov, ktoré by vyvolali podozrenie u ostatných členov kolónie. BRODITOP[®] obsahuje horké ochucovadlo (denatonium benzoát), ktoré výrazne znižuje riziko konzumácie deťmi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Noste vhodné ochranné rukavice. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte v dobre vetranych priestoroch. Po práci si umyte nezakryté časti tela vodou a mydlom. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Ak je prípravok používaný vo verejných priestoroch, je nutné ošetrovať plochy výrazne označiť informáciou a použiť antikoagulačných rodenticidov.

Prvá pomoc

V prípade podozrenia na otravu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

po požití - starostlivo vypláchnuť ústa vodou. Nevypúvať zvracanie, ak je postihnutý v

bezvedomí. Vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Lekáriovi odovzdať obal od prípravku, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov.

pri kontakte s pokožkou - zasiahnuté miesto dôkladne umyť mydlom a vodou.

pri nadýchnutí - postihnutého dopraviť na čerstvý vzduch. Pokiaľ sa postihnutý necíti dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

pri zasiahnutí očí - vyplachovať najmenej 15 minút čistou vodou i pod viečkami.

Príznaky otravy: Brodifacoum je nepriamy antikoagulant, pôsobí ako inhibítor vitamínu K1, vyvoláva krvácanie z nosa a ďasien, tvorbu zrazenín v koži, podkoží a na slizniciach, celkovú slabosť, prípadne šok.

Informácia pre lekárov: V prípade konzumácie väčšieho množstva produktu sa odporúča vyvolať zvracanie, vyplach žalúdka a kontrola aktivity protrombinu nie menej ako 18 hodín po požití. V prípade vyšších hodnôt sa odporúča podať vitamín K1. Antikoagulanty sú kontrindicované. Špecifický protijed: Vitamín K1 (Kanavit). V prípade potreby kontaktovať príslušné toxikologické informačné centrum: Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Déřera, Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. číslo : 02-547 74 166.

Skladovanie

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchu mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Uchovávať na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia obalov a zvyškov

Obaly od prípravku sa nesmú znova používať ak akýmkolvek účelom! Prázdne obaly môžu byť odoslané na skládku alebo na recykláciu až po vyčistení, ak sa koná v súlade s miestnymi a národnými predpismi. Zvyšky prípravku musia byť likvidované podľa zákona. Odpad zatriedte podľa kategórie odpadov. Zabráňte kontaminácii povrchových i podzemných vôd ako samotným prípravkom, tak aj vyprázdnenými obalmi. Zabráňte kontaminácii potravín, nápojov a krmív.

Doba použiteľnosti

Pri správnom spôsobe skladovania v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby

Dátum výroby a číslo šarže:

Výrobca prípravku: ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Taliansko, telefón +39/049/9597785 - www.zapiexpert.com - info@zapiexpert.com

Distribútor: DDD Servis

Slovenská, s.r.o., Svermova 31, 038 61 Vrútky, tel. +421 43-4284381, fax. +421 43-428 5125, e-mail: dddservis@dddservis.sk - www.dddservis.sk

Registračné číslo: SK15-MRP-006-376/14

Broditop[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Zapi



067106DD05-03



Balenie: **2,5kg**