

Goliath[®] Gel

Insekticídna nástraha vo forme pasty, určená na ničenie švábov a rusov v bytoch, hoteloch, zdravotníckych zariadeniach, skladoch, potravinárskych prevádzkach a ďalších objektoch komunálnej hygieny. Aplikácia je prevedená pomocou tlakového lisu, ktorý je dodávaný samostatne.

Účinná látka:

fipronil 0,05%, tj. 0,5 g/kg

tj. (+)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro-methylsulfinylpyrazol -3-karbonitril

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: fipronil CAS No.: 120068-37-3

Výstražné upozornenie:

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizik pre človeka a životné prostredie.

Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Tel.č.: +421-2-58 266 111

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Registračné číslo: bio/491/D/09/CCHLP

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo šarže: uvedené na obale

Balenie: 4 ks á 35 g (4 HDPE tuby + papierová krabica)

Goliath[®] je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.

Návod na použitie

Prípravok používajte v potravinárskych prevádzkach, bytových priestoroch, reštauráciách, hoteloch, nemocniciach, kuchyniach, skladoch, kanceláriách, chovoch laboratórnych zvierat, lietadlách a pod. Je vhodný najmä do objektov, kde nie je možné použiť klasický postrek.

Nástrahu aplikujte do miest, kde sa šváby a rusy zhromažďujú, najmä do priestorov medzi úkrytmi a zdrojom potravy.

Prípravok pôsobí na dospelcov i nymfy.

Nástrahu Goliath Gel aplikujte pomocou tlakového lisu nasledujúcim spôsobom:

Na lise stlačte dávkovaciu páku, prepínač uveďte do polohy R a zatahnite piest do zadnej polohy. Potom nastavte prepínač do polohy 1 a uvoľnite páku. Na piest nasadte tubu s prípravkom, zaistíte ju pootočením a nasadte aplikačnú ihlu. Zatlačte piest dopredu až sa dotkne dna tuby. Pootočte piestom tak, aby zuby na jeho osi smerovali dole. Potom môžete aplikovať nástrahu stlačením dávkovacej páky. Jedným stlačením dávkujete 0,03 g. po uvoľnení páky je potrebné potlačiť piest opäť dopredu.

Nástrahu aplikujte vo forme bodov na skryté miesta, ktoré nie sú príliš intenzívne osvetlené, najlepšie do rôznych škár a prasklín, ktoré slúžia ako úkryty. Pred aplikáciou je potrebné upratať a podľa možnosti odstrániť zdroje potravy.

Hmyz uhynie niekoľko hodín po prijíma nástrahu. Po 2 týždňoch je potrebné nástrahu skontrolovať a podľa potreby doplniť, pokiaľ je nástraha z 1. aplikácie spotrebovaná a je vidieť živé šváby alebo rusy.

Pri zásahoch proti švábovitému hmyzu je možné používať Goliath Gel samostatne. Je však možné tento prípravok aplikovať aj v dobe, kedy doznieva účinok postrekov, napr. Ako po použití prípravkov Ficam 80W, Crackdown Rapide alebo K-Othrine 2,5 SC. Ďalej je možné použiť Goliath Gel ako doplnok do postrekov, t.j. použiť ho na tie miesta, kde z najrôznejších dôvodov nie je možné aplikovať postrek. Nástraha Goliath Gel sa nesmie aplikovať na miesto čerstvo ošetrované postrekom, resp. aplikovať postrek na nástrahu.

Aplikačná dávka:

Bežná dávka:	Rusy	0,1 g.m ⁻²
	Šváby	2 x 0,1 g.m ⁻²
Zvýšená dávka:	Rusy	2 x 0,1 g.m ⁻²
	Šváby	3 x 0,1 g.m ⁻²

Zvyšnú dávku použite v prípadoch silného výskytu hmyzu, pri veľkom znečistení ošetrovaných priestorov a pri výskyte iných zdrojov potravy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci používajte odev a pracovné rukavice. Po práci si umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Prípravok používajte tak, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody, krmív a miest, kde sa s potravinami pracuje. Aplikujte na miesta, kde nástraha nebude dosiahnuteľná pre deti.

Prvá pomoc

Po náhodnom požití: vypláchnite ústa pitnou vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom pitnej vody najmenej 15 minút. vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. **02/54 77 41 66**).

Skladovanie:

Skladujte v suchých, chladných, uzavretých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, liekov a chemických látok (vrátane obalov), pri teplotách do 35 °C. Prípravok nesmie zmrznúť.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie obalov a zvyškov:

Prázdne obaly (tuby od pasty) po vyprázdnení a znehodnotení odovzdajte do separovaného komunálneho odpadu.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo nesprávneho použitia.

