



MUSKIL®

PŠENICA



Bromadiolón 0,0025% - Difenacoum 0,0025%

MUSKIL® PŠENICA

Požerová nástraha vo forme pšeničných zŕn určená k profesionálnej likvidácii škodlivých hlodavcov ako je potkan (*Rattus norvegicus*) alebo myš domáca (*Mus musculus*) v bytových i nebytových priestoroch, pivniciach, poválach, potravinárskych a poľnohospodárskych prevádzkach, chovoch hospodárskych zvierat ai.

| Zloženie: | bromadiolón, 25 mg.kg ⁻¹ difenacoum, 25 mg.kg ⁻¹ | CAS číslo 28772-56-7, číslo ES 249-205-9 CAS číslo 56073-07-5, číslo ES 259-978-4 |
|--|---|--|
| P102: Uchovávať mimo dosahu detí. P401: Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. P405: Uchovávať uzamknuté. P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280: Noste ochranné rukavice. P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P301+310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. | | |

Spôsob použitia

Z dôvodu prevedenia dokonalej deratizácie sa držte nasledujúcich pokynov:

1/ Posúdenie lokality

Pred zahájením vlastnej deratizácie vykonajte dokonalú prehliadku oblasti so zameraním na druhové určenie hlodavcov, úroveň i intenzitu zamorenia. Skontrolujte možné prístupové cesty, odstráňte všetky zdroje vody a potravy. S ohľadom na prítomnosť čerstvého trusu a ďalších stôp pohybu hlodavcov špecifikujte najvhodnejšie miesta pokládky nástrahy.

V prípade, že chcete minimalizovať použitie rodenticídnych návnad (napr. pri eliminácii hlodavcov v potravinárskych prevádzkach alebo v chovoch zvierat), odporúčame preferovať netoxické metódy likvidácie.

2/ Aplikácie

Nástrahu kladíme do miest, kde je viditeľná činnosť hlodavcov (čerstvý trus, zvyšky potravy, v blízkosti alebo vo vnútri nôr ap.) pomocou komerčne dostupných jedových staničiek. Ak nie sú jedové staničky k dispozícii, odporúčame z dôvodov ochrany necielových organizmov (domáce zvieratá, vtáky, popr. malé deti) a ochrany pred vlhkosťou použiť aspoň napr. kúsky drenážneho potrubia alebo papierové tácky či iné podložky pod dlaždice. Z dôvodu nutnosti prekrytia ľudského pachu je vhodné pri manipulácii s nástrahou použiť gumové alebo PVC rukavice. Prípravok je vyrábaný vo forme:

- volná návnada

Aplikačná dávka:

V prípade myši: Kladieme v množstve až 50g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť jednotlivých miest pokládky nástrahy sa pohybuje od 5 metrov (optimálna vzdialenosť) do metrov 2 (vysoký stupeň zamorenia).

V prípade potkanov: Kladieme v množstve až 100g nástrahy na jedno miesto. Vzdialenosť jednotlivých miest pokládky nástrahy sa pohybuje od 10 metrov (optimálna vzdialenosť) do metrov 5 (vysoký stupeň zamorenia).

3/ Monitoring

Starú (znečistenú, ohryzenú) nástrahu je nutné priebežne nahrádzať novou (odporúčame vykonávať kontrolu každé 2 týždne). V prípade, že niektorá návnadová miesta zostávajú nedotknuté, odporúčame zmeniť ich umiestnenie.

Ak nachádzame uhytné hlodavce, je nutné ich zozbierať a zlikvidovať podľa predpisov. Vždy dbajte na znemožnenie prístupu necielových zvierat, popr. i detí.

Ak už nedochádza k úbytku nástrahy, je možné považovať deratizáciu za ukončenú. Nespotrebované zvyšky nástrahy je treba odstrániť. Aby sa obmedzilo riziko návratu hlodavcov, je nutné udržiavať všetky miesta v čistote a prostá zvyškov potravy. K dokonalému odstráneniu prípravku po použití gélu z pistolového dávkovača použite plastovú stierku.

Pozor! Prípravok nesmie byť použitý ináč, než ako je uvedené v návode na použitie! Nedávajte na miesta, kde by bol dosiahnuteľný pre domáce alebo hospodárske zvieratá! Nesmie byť použitý vo voľnej prírode!

Vlastnosti a mechanizmus účinku

MUSKIL® je založený na interakcii antikoagulantov druhej generácie – bromadiolónu a difenacoumu. Pre cieľového jedinca je smrteľná jediná dávka. Znižuje zrážlivosť krvi, čo vedie k vonkajšiemu a vnútornému krvácaniu a následne k uhytniu. Cieľové zvieratá sú prilákané ochucovadlami obsiahnutými v nástraha a hynú počas troch až piatich dní po konzumácii bez výrazných klinických príznakov, ktoré by vyvolali podozrenie u ostatných členov kolónie.

MUSKIL® obsahuje horké ochucovadlo (denatonium benzoat), ktoré výrazne znižuje riziko konzumácie deťmi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Noste vhodné ochranné rukavice. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Po práci si umyte nezakryté časti tela vodou a mydlom. Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Ak je prípravok používaný vo verejných priestoroch, je nutné ošetrovať plochy výrazne označiť informáciou a použiť antikoagulačných rodenticidov.

Prvá pomoc

V prípade podozrenia na otravu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. **po požití** - starostlivo vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí. Vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Lekáriovi odovzdať obal od prípravku, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov.

REGISTROVANÝ BIOCIDNY VÝROBOK



www.zapiexpert.com - info@zapiexpert.com

pri kontakte s pokožkou - zasiahnuté miesto dôkladne umyť mydlom a vodou
pri nadýchnaní - postihnuteľného dopraviť na čerstvý vzduch. Pokiaľ sa postihnutý necíti dobre, vyhľadať lekársku pomoc.

pri zasiahnutí očí - vyplachovať najmenej 15 minút čistou vodou i pod viečkami.

Príznaky otravy: Bromadiolón a difenacoum sú nepriame antikoagulanty, pôsobi ako inhibitory vitamínu K1, vyvolávajú krvácanie z nosa a ďasien, tvorbu krvných zrazenín v koži, podkoží a na slizniciach, celkovú slabosť, prípadne šok.

Informácia pre lekárov: V prípade konzumácie väčšieho množstva produktu sa doporučuje vyvolať zvracanie, výplach žalúdka a kontrola aktivity protrombínu nie menej ako 18 hodín po požití. V prípade vyšších hodnôt sa odporúča podať vitamín K1. Po dvoch týždňoch od ukončenia liečby skontrolujte opakovane aktivitu protrombínu a v prípade opätovne zvýšených hodnôt obnovte liečbu. Antikoagulanty sú kontraindikované. Špecifický protijed: Vitamín K1 (Kanavit). V prípade potreby konzultovať príslušné toxikologické informačné centrum: Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Déreya, Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. číslo : 02-547 74 166.

Skladovanie

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchu mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia obalov a zvyškov

Obaly od prípravku sa nesmú znova používať na akékoľvek účely! Prázdne obaly môžu byť odoslané na skládku alebo na recykláciu až po vyčistení, ak sa koná v súlade s miestnymi a národnými predpismi. Zvyšky prípravku musí byť likvidované podľa zákona. Odpad zatriedte podľa katalógu odpadov. Zabráňte kontaminácii povrchových i podzemných vôd ako samotným prípravkom, tak i vyprázdnenými obalmi. Zabráňte kontaminácii potravín, nápojov a krmív.

Doba použiteľnosti

Pri správnom spôsobe skladovania v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby

Dátum výroby a číslo šarže:

Výrobca prípravku

ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD),
Taliano, telefon +39/049/9597785

Dodávca

DDD Servis Slovakia, s.r.o., Švermova 31, 038 61 Vrútky
tel. +421 43-4284381, fax. +421 43-428 5125
e-mail: ddservis@dddservis.sk - www.dddservis.sk

Registračné číslo CCHLP: 2013/397/1119/SK/AMR/1077

Muskil® je registrovaná ochranná známka spoločnosti ZAPI



25 kg

Balenie:

068266DDSDS.02