

CZ Ratimor granule

Účinná látka: bromadiolon 0,05 g/kg (CAS: 28772-56-7) **Formulace:** Nástraha ve formě granul s obsahem účinné látky k přímému použití.

RODENTICID k hubení potkanů, krys a myši uvnitř a vně budov za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných produktů a materiálů.

Upozornění: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte ochranné rukavice. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Určeno pro profesionální použití. Zabráňte dětem, ptákům a nevlídným organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeží), v přístupu k nástraze.

Číslo povolení: CZ-2013-0020

POKYNY PRO UMÍSTOVÁNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ Nástrahu umístíte na místa, kde se objevují stopy výskytu hlodavců, jako je čerstvý trus uvnitř budov nebo v blízkosti hnízd a nor, cestíček nebo míst, kam hlodavci chodí žrát. Rozmístíte nástrahu všude po zamořené oblasti. Obecně je mnohem účinnější použít větší počet menších dávek nástrahy než menší počet větších dávek nástrahy. Velké dávky nástrahy zvyšují riziko pro divoce žijící zvířata a živočichy, proti kterým není určena. **Dávkování: - Pro potkany a krysy (*Rattus norvegicus*)** jako dávku použijte nástrahu do 200 g. Dávky nástrahy rozmístíte ve vzdálenosti 10m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 5m. S dávkami nástrahy po rozmístění několik dní nehybejte a nepemístíte je. Jestliže po 7-10 dnech na nástraze nezjistíte žádné známky aktivity hlodavců, přemístíte nástrahu do oblasti s větší aktivitou. - **Pro myši (*Mus musculus*)** jako dávku použijte nástrahu do 40 g. Dávky nástrahy rozmístíte ve vzdálenosti 5m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 2m. Myši jsou velmi zvědavé, proto v procesu hubení může pomoci, když nástrahy každé 2-3 dny při kontrole nebo doplňování přemístíte. Nástrahu chraňte před zvířaty, proti kterým není určena, a před vodou nejlépe použitím jedových staniček, jež jsou na trhu. Jestliže je nemáte k dispozici, umístíte nástrahu na tácky pro nástrahu a do otvorů odpadních rour nebo pod kusy střešních tašek, desek nebo vlnitého plechu, které jsou stabilně opevněny o stěnu a vhodné zatíženy tak, aby byl přístup k nástraze zneemožněn (třížen) dětem, ptákům a zvířátky, proti kterým není určena. V prvních 10-14 dnech často kontrolujte místa s nástrahou a doplňte nástrahu, kterou sežrali hlodavci, poškodila voda nebo znečistila špína. Jestliže na určitých místech byla sežrána všechna nástraha, zvěřete množství nástrahy tak, že zvýšíte počet míst s nástrahou. Nezvyšujte velikost dávek nástrahy. Stejně jako u všech antikoagulantních rodenticidů hlodavci uhynou teprve po několika dnech po požití nástrahy, obvykle po 4-10 dnech. **Pro profesionální použití:**Při použití proti krysám a potkanům musí být použity komerčně dostupné deratizanti staničky. Při použití proti myším lze použít deratizanti staničky nebo nástrahu umístit do zásobníků na chráněných místech. Zajistěte nástrahu tak, aby ji nebylo možné odnáhnout. **MECHANISMUS ÚČINKU:** Bromadiolon zabírá tvorbu protrombinu v krvi, což způsobuje krvácení a úhyn hlodavce. Úhyn jednotlivých hlodavců nemá vliv na odolnost vůči nástrahám živých hlodavců. Je účinný také proti hlodavcům, kteří jsou odolní proti antikoagulantním rodenticidům první generace. **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PODMÍNKY BEZPEČNÉHO POUŽITÍ** Přípravek se nesmí používat na místech, kde může dojít ke kontaktu s povrchem potravin nebo krmiv, kuchyňského náčiní či jejich kontaminací. Vyhybejte se jakémukoliv styku s ústy. Před jídlem a po použití si umyjte ruce a zasažené pokožku. Nástrahy musí být bezpečně rozmístěny tak, aby se minimalizovalo riziko požití nástrahy jinými zvířaty nebo dětmi. Pokud je to možné, nástraha musí být zajištěna proti jejímu odtažení mimo místo aplikace. V pravidelných intervalech kontrolujte a odstraňujte uhybné hlodavce, alespoň tak často, jak kontrolujete a nebo doplňujete nástrahu. Uhybné hlodavce odstraňujte v souladu s místními předpisy. Pokud se používají bezpečnostní jedové staničky, tyto musí být jasně označeny, že obsahují rodenticidy a že se s nimi nemá hýbat. Nepoužívejte rodenticidy s obsahem antikoagulantu jako trvalé nástrahy. Pokud se výrobek používá na veřejně přístupných místech, tato místa musí být v průběhu procesu likvidace hlodavců označena a u nástrah musí být také označeny, které upozorňují na riziko primární a sekundární otravy antikoagulantem a popisuje první pomoc v případě otravy. **PŘÍZNAKY OTRAVY:** Bromadiolon je antikoagulant, jenž způsobuje krvácení; to se může objevit i několik dní po kontaktu. **POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:** V případě požití nebo při pocitu nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte etiketu). Při styku s pokožkou odstraňte znečištěné oblečení. Pokožku omyjte vodou a mýdlem. Pokud jsou zasaženy oči, důkladně je vymyjte velkým množstvím čisté vody. Při požití neprodleně vyhledejte pomoc lékaře a ukažte mu tento obal nebo etiketu. **PROTILÁTKA:** Vitamin K1 (pod lékařským dohledem). **SKLADOVÁNÍ:** Výrobek skladujte v originálním obalu, těsně zavřený a na bezpečném místě. Skladujte na suchém, chladném a větraném místě. **BEZPEČNÁ LIKVIDACE NEPOUŽITÉHO PROSTŘEDKU A JEHO OBALU:** Po použití odstraňte všechny nástrahy a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy. Odpadní obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

OBSAH: 4 kg

SK Ratimor granule

Aktivní látka: bromadiolon 0,05 g/kg (CAS no.: 28772-56-7) **Formulácia:** granule, na okamžité použitie (RB)

RODENTICÍD pre kontrolu potkanov a myši v kanalizácii, interiéri a exteriéri v okolí budov. Len na profesionálne použitie.

Upozornenie: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Noste ochranné rukavice. PO POŽITÍ: okamžite volajte **NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM** alebo lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/oblasťmi/národnými/mezištátnymi nariadeniami. **Zabráňte nebezpečenstvu kontaminácie človeka a životného prostredia, riaďte sa pokynmi v návode na použitie.**

Zabráňte prístupu k nástrahe deťom, vtákom a zvieratám pre ktoré tato návnada nie je určená (psy, mačky, ošipané a hydina)

Číslo registrácie: 2011/2249/12026/SK/MA/19237

Návod na použitie Návnadu umiestniť na miesta výskytu hlodavcov, na miesta kde je viditeľný výskyt hlodavcov, čerstvý trus, v blízkosti hniezd a miest kde sa hlodavce krmia. Umiestnite návnady v celej napadnutej oblasti. **Odporúčané množstvo použitia:** - Pri napadnutí **potkanmi (*R.norvegicus*)** použij návnadu miestami v množstve 200g. Bodovo rozdeľiť 10m od seba, v prípade veľkého výskytu hlodavcov na 5m. Nástrahu neprekladajte ani s ňou nemanipulujte niekoľko dní po uložení. V prípade, že po 7-10 dňoch nie sú príznaky výskytu hlodavcov, návnadu presunieme na miesto väčšieho pohybu hlodavcov. - Pri napadnutí **myšami (*M.musculus*)** použij návnadu miestami do 40g. Bodovo umiestniť na 5m od seba, znížiť vzdialenosť až na 2 metre pri veľkom zamorení. Myši sú veľmi zvedavé, a pomôže ich voči procesu presunúť raz za 2-3 dni návnadu na iné miesta, ak si viditeľné príznaky kontaktu s návnadou. Miesta s návnadou chraňte pred deťmi, necieľovou skupinou zvierat a kontamináciou vodných zdrojov. Najvhodnejšie je použitie komerčných nástrahových staničiek. Ak nie sú k dispozícii, umiestnite návnadu do vnútra drepaného potrubia, pod kusy bridlice, dosiek alebo časti vlnitého plechu, zabrání prístupu k návnade deťom, vtákom a necieľovou skupine zvierat. V pravidelných intervaloch kontrolovať miesta s návnadou. Doplňat návnadu, ktorá bola zjednaná predpísané ak bola znehodnotená počasím, alebo znečistená špinou. Zvýšte počet miest s návnadou na miestach kde návnada bola upne zjednaná. Nezvyšujte ale maximálnu dávku na miesto. Ako pri všetkých antikoagulantných rodenticidných prípravkoch, hlodavce uhybnú o niekoľko dní po požití návnady , v priemere 4-10 dní. **Účinko:** Bromadiolon zabíraje zraňujú krv, spôsobuje vnútorné krvácanie a následne smrť hlodavca. Produkt začína pôsobiť v krátkej dobe po požití. Uhytnutie jedného z hlodavcov nemá vplyv na účinko návnady na ostatne hlodavce, ktoré sú stále nažive. Je účinný na hlodavce, ktoré už majú odolnosť na WARFARIN a iné antikoagulanty prvej generácie. **Bezpečnostné opatrenia a podmienky pre bezpečné použitie:** Zabráňte kontaminácii istnej dutiny. Pred jedniami a po použití prípravku dôkladne umyť ruky a odkryté miesta na koži. Návnada musí byť uskladnená "na bezpečnom mieste, zabránit požitiu návnady deťmi a inými necieľovými zvieratami. Ak je to možné zabraňte návnadu proti odľudčeniu. V pravidelných intervaloch kontrolujeme a zbierame uhybné hlodavce, aspoň v tej istej frekvencii ako dopĺňame a menime návnadu. Uhybné hlodavce likvidujeme podľa príslušných zákonov. Ak používame stanicky mali byt zreteľne označené o obsahu rodenticidov a dôležité informácie o tom, že sa nemá s nimi manipulovať. Pri používaní produktu na verejných miestach, miesto musí byť označené tabulami s upozornením o možnosti primárnej a sekundárnej otravy antikoagulantami, ďalej o použití prvej pomoci pri prípadnej otravy. Prípravok obsahuje horké činidlo denatonium benzoate, BITREX, ktoré pôsobí ako chuťový odpudzovač pre človeka. **Príznaky otravy:** Bromadiolon je antikoagulant, ktorý môže spôsobiť krvácanie, ktoré sa objaví aj o niekoľko dní po použití. **Prvá pomoc pri požití:** Pri nechechom požití alebo pri príznakoch nevoľnosti vyhľadajte ihneď lekársku pomoc (ak je to možné prineste aj etiketu). V prípade kontaktu s kožou zavrte sa kontaminovaného oblečenia. Dôkladne umyte ruky vodou a mýdlom. Ak sa prípravok dostal do očí, vypláchnite oči dôkladne prúdom tečúcej vody. V prípade prehltnutia, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukažte mu etiketu. **Protijed:** Vitamín K1 (aplikovaný pod lekársnym dozorom). Liečbu postihnuteho je možné konzultovať s toxikologickým informačným centrom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel:00421 2 54 77 41 66, fax: 00421 2 54 77 46 05. **Skladovanie:** Skladujte v originálnom balení, uzavreté na bezpečnom mieste. Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. **Bezpečnosť pri likvidácii nepoužitého prostriedku a obalu:** Odstraňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov. **»Používať biocídne výrobky bezpečne-**

VÝROBCE A DRŽITEĽ POVOLENÍ/VÝROBCA A DRŽITEĽ REGISTRÁCIE: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Slovinsko, www.unichem.si. Tel: +386 1 7558 152, e-mail: unichem@unichem.si

DOVOZCE: Unichem Agro CZ s.r.o., Ke Koulce 2, 15000 Praha 5, Česka Republika, Tel. : + 420 724565724

DOVOZCA: Unichem Slovakia s.r.o., Bratislava, Odeska 71, Tel.: + 21 911221311

DATUM VÝROBY, SKLADOVATEĽNOSŤ A ČÍSLO ŠARŽE/DATUM VÝROBY, DATUM SPOTREBY A ČÍSLO ŠARŽE:

CZ Ratimor granule

Účinná látka: bromadiolon 0,05 g/kg (CAS: 28772-56-7) **Formulace:** Nástraha ve formě granul s obsahem účinné látky k přímému použití.

RODENTICID k hubení potkanů, krys a myši uvnitř a vně budov za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných produktů a materiálů.

Upozornění: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte ochranné rukavice. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Určeno pro profesionální použití. Zabráňte dětem, ptákům a nevlídným organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeží), v přístupu k nástraze.

Číslo povolení: CZ-2013-0020

POKYNY PRO UMÍSTOVÁNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ Nástrahu umístíte na místa, kde se objevují stopy výskytu hlodavců, jako je čerstvý trus uvnitř budov nebo v blízkosti hnízd a nor, cestíček nebo míst, kam hlodavci chodí žrát. Rozmístíte nástrahu všude po zamořené oblasti. Obecně je mnohem účinnější použít větší počet menších dávek nástrahy než menší počet větších dávek nástrahy. Velké dávky nástrahy zvyšují riziko pro divoce žijící zvířata a živočichy, proti kterým není určena. **Dávkování: - Pro potkany a krysy (*Rattus norvegicus*)** jako dávku použijte nástrahu do 200 g. Dávky nástrahy rozmístíte ve vzdálenosti 10m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 5m. S dávkami nástrahy po rozmístění několik dní nehybejte a nepemístíte je. Jestliže po 7-10 dnech na nástraze nezjistíte žádné známky aktivity hlodavců, přemístíte nástrahu do oblasti s větší aktivitou. - **Pro myši (*Mus musculus*)** jako dávku použijte nástrahu do 40 g. Dávky nástrahy rozmístíte ve vzdálenosti 5m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 2m. Myši jsou velmi zvědavé, proto v procesu hubení může pomoci, když nástrahy každé 2-3 dny při kontrole nebo doplňování přemístíte. Nástrahu chraňte před zvířaty, proti kterým není určena, a před vodou nejlépe použitím jedových staniček, jež jsou na trhu. Jestliže je nemáte k dispozici, umístíte nástrahu na tácky pro nástrahu a do otvorů odpadních rour nebo pod kusy střešních tašek, desek nebo vlnitého plechu, které jsou stabilně opevněny o stěnu a vhodné zatíženy tak, aby byl přístup k nástraze zneemožněn (třížen) dětem, ptákům a zvířátky, proti kterým není určena. V prvních 10-14 dnech často kontrolujte místa s nástrahou a doplňte nástrahu, kterou sežrali hlodavci, poškodila voda nebo znečistila špína. Jestliže na určitých místech byla sežrána všechna nástraha, zvěřete množství nástrahy tak, že zvýšíte počet míst s nástrahou. Nezvyšujte velikost dávek nástrahy. Stejně jako u všech antikoagulantních rodenticidů hlodavci uhynou teprve po několika dnech po požití nástrahy, obvykle po 4-10 dnech. **Pro profesionální použití:**Při použití proti krysám a potkanům musí být použity komerčně dostupné deratizanti staničky. Při použití proti myším lze použít deratizanti staničky nebo nástrahu umístit do zásobníků na chráněných místech. Zajistěte nástrahu tak, aby ji nebylo možné odnáhnout. **MECHANISMUS ÚČINKU:** Bromadiolon zabírá tvorbu protrombinu v krvi, což způsobuje krvácení a úhyn hlodavce. Úhyn jednotlivých hlodavců nemá vliv na odolnost vůči nástrahám živých hlodavců. Je účinný také proti hlodavcům, kteří jsou odolní proti antikoagulantním rodenticidům první generace. **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PODMÍNKY BEZPEČNÉHO POUŽITÍ** Přípravek se nesmí používat na místech, kde může dojít ke kontaktu s povrchem potravin nebo krmiv, kuchyňského náčiní či jejich kontaminací. Vyhybejte se jakémukoliv styku s ústy. Před jídlem a po použití si umyjte ruce a zasažené pokožku. Nástrahy musí být bezpečně rozmístěny tak, aby se minimalizovalo riziko požití nástrahy jinými zvířaty nebo dětmi. Pokud je to možné, nástraha musí být zajištěna proti jejímu odtažení mimo místo aplikace. V pravidelných intervalech kontrolujte a odstraňujte uhybné hlodavce, alespoň tak často, jak kontrolujete a nebo doplňujete nástrahu. Uhybné hlodavce odstraňujte v souladu s místními předpisy. Pokud se používají bezpečnostní jedové staničky, tyto musí být jasně označeny, že obsahují rodenticidy a že se s nimi nemá hýbat. Nepoužívejte rodenticidy s obsahem antikoagulantu jako trvalé nástrahy. Pokud se výrobek používá na veřejně přístupných místech, tato místa musí být v průběhu procesu likvidace hlodavců označena a u nástrah musí být také označeny, které upozorňují na riziko primární a sekundární otravy antikoagulantem a popisuje první pomoc v případě otravy. **PŘÍZNAKY OTRAVY:** Bromadiolon je antikoagulant, jenž způsobuje krvácení; to se může objevit i několik dní po kontaktu. **POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:** V případě požití nebo při pocitu nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte etiketu). Při styku s pokožkou odstraňte znečištěné oblečení. Pokožku omyjte vodou a mýdlem. Pokud jsou zasaženy oči, důkladně je vymyjte velkým množstvím čisté vody. Při požití neprodleně vyhledejte pomoc lékaře a ukažte mu tento obal nebo etiketu. **PROTILÁTKA:** Vitamin K1 (pod lékařským dohledem). **SKLADOVÁNÍ:** Výrobek skladujte v originálním obalu, těsně zavřený a na bezpečném místě. Skladujte na suchém, chladném a větraném místě. **BEZPEČNÁ LIKVIDACE NEPOUŽITÉHO PROSTŘEDKU A JEHO OBALU:** Po použití odstraňte všechny nástrahy a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy. Odpadní obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

OBSAH: 4 kg

SK Ratimor granule

Aktivní látka: bromadiolon 0,05 g/kg (CAS no.: 28772-56-7) **Formulácia:** granule, na okamžité použitie (RB)

RODENTICÍD pre kontrolu potkanov a myši v kanalizácii, interiéri a exteriéri v okolí budov. Len na profesionálne použitie.

Upozornenie: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Noste ochranné rukavice. PO POŽITÍ: okamžite volajte **NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM** alebo lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/oblasťmi/národnými/mezištátnymi nariadeniami. **Zabráňte nebezpečenstvu kontaminácie človeka a životného prostredia, riaďte sa pokynmi v návode na použitie.**

Zabráňte prístupu k nástrahe deťom, vtákom a zvieratám pre ktoré tato návnada nie je určená (psy, mačky, ošipané a hydina)

Číslo registrácie: 2011/2249/12026/SK/MA/19237

Návod na použitie Návnadu umiestniť na miesta výskytu hlodavcov, na miesta kde je viditeľný výskyt hlodavcov, čerstvý trus, v blízkosti hniezd a miest kde sa hlodavce krmia. Umiestnite návnady v celej napadnutej oblasti. **Odporúčané množstvo použitia:** - Pri napadnutí **potkanmi (*R.norvegicus*)** použij návnadu miestami v množstve 200g. Bodovo rozdeľiť 10m od seba, v prípade veľkého výskytu hlodavcov na 5m. Nástrahu neprekladajte ani s ňou nemanipulujte niekoľko dní po uložení. V prípade, že po 7-10 dňoch nie sú príznaky výskytu hlodavcov, návnadu presunieme na miesto väčšieho pohybu hlodavcov. - Pri napadnutí **myšami (*M.musculus*)** použij návnadu miestami do 40g. Bodovo umiestniť na 5m od seba, znížiť vzdialenosť až na 2 metre pri veľkom zamorení. Myši sú veľmi zvedavé, a pomôže ich voči procesu presunúť raz za 2-3 dni návnadu na iné miesta, ak si viditeľné príznaky kontaktu s návnadou. Miesta s návnadou chraňte pred deťmi, necieľovou skupinou zvierat a kontamináciou vodných zdrojov. Najvhodnejšie je použitie komerčných nástrahových staničiek. Ak nie sú k dispozícii, umiestnite návnadu do vnútra drepaného potrubia, pod kusy bridlice, dosiek alebo časti vlnitého plechu, zabrání prístupu k návnade deťom, vtákom a necieľovou skupine zvierat. V pravidelných intervaloch kontrolovať miesta s návnadou. Doplňat návnadu, ktorá bola zjednaná predpísané ak bola znehodnotená počasím, alebo znečistená špinou. Zvýšte počet miest s návnadou na miestach kde návnada bola upne zjednaná. Nezvyšujte ale maximálnu dávku na miesto. Ako pri všetkých antikoagulantných rodenticidných prípravkoch, hlodavce uhybnú o niekoľko dní po požití návnady , v priemere 4-10 dní. **Účinko:** Bromadiolon zabíraje krv, spôsobuje vnútorné krvácanie a následne smrť hlodavca. Produkt začína pôsobiť v krátkej dobe po požití. Uhytnutie jedného z hlodavcov nemá vplyv na účinko návnady na ostatne hlodavce, ktoré sú stále nažive. Je účinný na hlodavce, ktoré už majú odolnosť na WARFARIN a iné antikoagulanty prvej generácie. **Bezpečnostné opatrenia a podmienky pre bezpečné použitie:** Zabráňte kontaminácii istnej dutiny. Pred jedniami a po použití prípravku dôkladne umyť ruky a odkryté miesta na koži. Návnada musí byť uskladnená "na bezpečnom mieste, zabránit požitiu návnady deťmi a inými necieľovými zvieratami. Ak je to možné zabraňte návnadu proti odľudčeniu. V pravidelných intervaloch kontrolujeme a zbierame uhybné hlodavce, aspoň v tej istej frekvencii ako dopĺňame a menime návnadu. Uhybné hlodavce likvidujeme podľa príslušných zákonov. Ak používame stanicky mali byt zreteľne označené o obsahu rodenticidov a dôležité informácie o tom, že sa nemá s nimi manipulovať. Pri používaní produktu na verejných miestach, miesto musí byť označené tabulami s upozornením o možnosti primárnej a sekundárnej otravy antikoagulantami, ďalej o použití prvej pomoci pri prípadnej otravy. Prípravok obsahuje horké činidlo denatonium benzoate, BITREX, ktoré pôsobí ako chuťový odpudzovač pre človeka. **Príznaky otravy:** Bromadiolon je antikoagulant, ktorý môže spôsobiť krvácanie, ktoré sa objaví aj o niekoľko dní po použití. **Prvá pomoc pri požití:** Pri nechechom požití alebo pri príznakoch nevoľnosti vyhľadajte ihneď lekársku pomoc (ak je to možné prineste aj etiketu). V prípade kontaktu s kožou zavrte sa kontaminovaného oblečenia. Dôkladne umyte ruky vodou a mýdlom. Ak sa prípravok dostal do očí, vypláchnite oči dôkladne prúdom tečúcej vody. V prípade prehltnutia, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukažte mu etiketu. **Protijed:** Vitamín K1 (aplikovaný pod lekársnym dozorom). Liečbu postihnuteho je možné konzultovať s toxikologickým informačným centrom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel:00421 2 54 77 41 66, fax: 00421 2 54 77 46 05. **Skladovanie:** Skladujte v originálnom balení, uzavreté na bezpečnom mieste. Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. **Bezpečnosť pri likvidácii nepoužitého prostriedku a obalu:** Odstraňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázne obaly zlikvidovať podľa miestnych predpisov. **»Používať biocídne výrobky bezpečne-**

VÝROBCE A DRŽITEĽ POVOLENÍ/VÝROBCA A DRŽITEĽ REGISTRÁCIE: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Slovinsko, www.unichem.si. Tel: +386 1 7558 152, e-mail: unichem@unichem.si

DOVOZCE: Unichem Agro CZ s.r.o., Ke Koulce 2, 15000 Praha 5, Česka Republika, Tel. : + 420 724565724

DOVOZCA: Unichem Slovakia s.r.o., Bratislava, Odeska 71, Tel.: + 21 911221311

DATUM VÝROBY, SKLADOVATEĽNOSŤ A ČÍSLO ŠARŽE/DATUM VÝROBY, DATUM SPOTREBY A ČÍSLO ŠARŽE:

Varování / Pozor



Varování / Pozor

