parafínové bloky · parafínové bloky · parafínové bloky · parafínové bloky

CZ RATIMOR parafínové bloky 45 g

Účinná látka: 0.05g/kg antikoagulantu Bromadialon
CAS:č.28772-56-7 IUPAC:3-[3-(4'bromobifenyl–4il)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxykumarin 99,995% atraktivního nástrahového materiálu.
Přípravek obsahuje hořké činidlo BITREX, které působí jako chuťový odpuzovač pro člověka.
Skupenství přípravku: parafínová nástraha (RB)
Pozor! Obsahuje antikoagulant bromadialon! Uchovávejte mimo dosah děti a nepoučených osob. Zákaz používání přípravku ve volné přírodě tak, aby aplikace neohrozila volně žijící živočichy a životní prostředí. Přípravek nesmí být požit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití! **Návod na použití a dávkování:** Ratimor parafinové nástrahy používáme jako rodenticid v místech: v prostorách kanalizace,do nor a okolo děr, ve vlhkých nebo zatopených sklepích, okolo stavebních otvorů,a jiných různých zakoutích. ***Hubení potkanů, krys:*** 2 paraf. bloky na 5m^{2}, v případech většího výskytu 2 paraf. bloky na 2,5m^{2} (na několik míst –nejlépe v blízkosti jejich hnízd nebo na místa jejich výskytů) ***Hubení myší domác:*** 1 paraf. blok na 7m^{2}, v případech většího výskytu 1 paraf. blok na 3m^{2}. na několik míst (nejlépe v blízkosti jejich hnízd nebo na místa jejich výskytů). Aplikované nástrahy kontrolovat a doplňovat v místech jejich odběru. Nástrahy umístit do nepřístupných míst pro děti, domácí zvířata, ... ((nejlépe do trubek a podobných skrytých míst).
Mechanismus účinku: Bromadiolon zamezuje srážení krve,kde způsobí vnitřní krvácení a úhyn hlodavce. Ratimor parafinové bloky začnou účinkovat brzy po požití.Uhynutí jednotlivých hlodavců nezpůsobí odpor k návnadě u živých hlodavců. Myši,krysy a potkaní, když se otrávi, dostanou pocit dušení a utíkají do otevřenému prostoru. Akční deratizace s Ratimor parafinovými bloky trvá 7 – 10 dní. **Skladování přípravku:** přípravek se skladuje v původních neporušených obalech na bezpečném místě (S53) odděleně od potravin, krmiv (S13), hnojiv a různých aromatických látek včetně pesticidů, aby nástrahy nepřejaly zápach, čímž by mohly ztratit svoji atraktivitu pro hlodavce. Nástrahy chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte při teplotě 5 –30 °C.
Likvidace obalů: prázdné obaly před likvidací znehodnoťte a pak likvidujte v komunálním odpadu.
Bezpečnostní opatření: Při práci s nástrahou používejte ochranný oděr a gumové rukavice a boty. Při práci není dovoleno jíst, pít nebo kouřit. (S20/21). Po práci a před jídlem se důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem. **Příznaky otravy:** v případě otravy dochází krátce po požití k nevolnosti, zvraceni, zrychlenému dýchání, a k neupřesněné bolesti břicha. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.
První pomoc: ***Při náhodném požití:*** vypít 1/2 litru vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení, nejdéle do 10 minut. ***Při zasažení pokožky:*** odstranit zasažený oděv, důkladně se omýt tekoucí vodou a mýdlem. ***Při zasažení očí:*** vyplachovat proudem čisté tekoucí vody po dobu 5 –10 minut. ***Při nadýchání prachu:*** přerušit práci s informací o poskytnuté první pomoci. ANTIDOTEM proti působení bromadialonu je vitamin K1-Kanavit. Jeho dávku určí vždy lékař. Léčbu postiženého lze konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224919293, 224915402
RATIMOR je registrovaná ochranná známka firmy UNICHEM d.o.o.
Výrobce: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, tel.: +386 1 7558 150, www.unichem.si
Dovozce: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, tel.:+420 257326556,
e-mail: unichem_agro_cz@volny.cz
S věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S46 Při použití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Použitelnost do:
Číslo výrobní šarže:

Na základě posouzení ÚSKVBL je přípravek schválen pro použití v zemědělských a potravinářských provozech bez připomínek.
Účinné i na hrabošovité hlodavce v komunální sféře.

Obsah: 10 kg

2
HDPE

Bitrex

RATIMOR®

Požerová nástraha k jednorázovému hubení potkanů, krys, myší domácích a na hrabošovité hlodavce v komunální sféře.

10 kg

SK RATIMOR parafínové bloky 45 g

Účinná látka: 0.05g/kg antikoagulant bromadialon 99,995% atraktívneho nástrahového materiála. CAS:č.28772-56-7 IUPAC:3-[3-(4 ' bromobifenyl–4il)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxykumarin
Prípravok obsahuje horké činidlo BITREX, ktoré pôsobí ako chuťový odpudzovač pre človeka.
Skupenstvo prípravku: parafínová nástraha (RB)
Pozor! Obsahuje antikoagulant bromadialon! Uchovávajte mimo dosah detí a nepoučených osôb. Zákaz používania prípravku vo voľnej prírode tak, aby aplikácia ohrozila voľne žijúce druhy a životné prostredie. Prípravok nesmie byť použitý inak, ako je uvedené v návode na použitie. **Návod na použitie/dávkovanie:** Nástrahy umiestnite do miest (hniezda, cestičky), kde sa pohybujú myši a potkany. Ratimor parafínové bloky sa používa ako rodenticid v kanalizačných priestoroch, norách a okolo otvorov vo vlhkých alebo zatopených pivniciach, okolo stavebných otvorov a v rozličných zákutiach: ***hubenie červených potkanov, sivých potkanov, krýs:*** v množstve zodpovedajúcemu 2 paraf. bloky na 5 m^{2}, v prípadoch väčšieho výskytu 2 paraf. bloky na 2,5 m^{2} na niekoľko miest, ***hubenie myší domácej:*** v množstve zodpovedajúcom 1 paraf. blok na 7 m^{2}, v prípadoch väčšieho výskytu 1 paraf. blok na 3 m^{2} na niekoľko miest. Aplikované nástrahy kontrolovať a doplňovať v miestach ich odberu. Nástrahy umiestniť do neprístupných miest pre deti, domáce zvieratá, ... (najlepšie do trubiek a podobných skrytých miest). **Mechanizmus účinku:** Bromadiolon zabraňuje tvorbe protrombínu v krvi, čo spôsobuje vnútorné a vonkajšie krvácanie a úhyn hlodavcov. Ratimor parafínové bloky začnú pôsobiť skoro po požití a hlodavce do niekoľkých dní uhynú, pričom to nespôsobí nedôveru resp. odpor voči návnade, čo umožňuje úplnú deratizáciu. Myši a potkany, ktoré sa otrávia, hoci iba jednou dávkou majú pocit dusenia a usilujú sa dosiahnuť otvorené priestranstvo. Deratizácia pomocou Ratimor parafínových blokov trvá 7 až 10 dní.
Skladovanie prípravku: prípravok sa skladuje v pôvodných neporušených obaloch na bezpečnom mieste oddelene od potravín, krmív, hnojív a rôznych aromatických látok vrátane pesticídov, aby nástrahy neprebrali zápach, čím by mohli stratiť svoju atraktivitu pre hlodavce. Nástrahy chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkom. Skladujte pri teplote 5-30 °C.
Likvidácia obalov: prázdne obaly pred likvidáciou znehodnoťte a potom likvidujte v komunálnom odpade. **Bezpečnostné opatrenie:** pri práci s nástrahou používajte ochranný odev a gumové rukavice a topánky. Pri práci nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť. Po práci a pred jedlom sa dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. **Príznaky otravy:** krátko po požití nevoľnosť a zvracanie.Po niekoľkých hodinách až dňoch krvácanie do pokožky a sliznic, tvorba modrín,močenie krvi, krvavá stolica, krvácanie z nosa a dasien. **Prvá pomoc:** ***Po požití prípravku:*** vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0,3 l vlažnej vody a nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. ***Pri zasiahnutí pokožky:*** odstrániť zasiahnutý odev, dôkladne sa umyť tečúcou vodou a mydlom. ***Pri zasiahnutí očí:*** vyplachovať prúdom tečúcej čistej vody po dobu 5 minút. ***Pri nadýchaní prachu:*** prerušiť prácu, vyviesť postihnutého na vzduch. Lekára informovať o poskytnutej prvej pomoci. Antidotom proti pôsobeniu bromadialonu je vitamín K. Jeho dávku určí vždy lekár. Liečbu postihnutého je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným strediskom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: +421 2 54 77 41 66, fax: +421 2 54 77 46 05.
RATIMOR je registrovaná ochranná známka firmy UNICHEM d.o.o.
S vety: S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S13 Uchovávajte mimo kontakt s potravinami, nápojov a krmív pre zvieratá. S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice. S46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekarsk pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
Regis. č.: bio/551/D/06/1/CCHLP "Používajte biocídne výrobky bezpečne"
Výrobca: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika,
tel.: +386 1 7558 150, www.unichem.si
Dovozca: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha,
tel.:+420 257326556,
e-mail: unichem_agro_cz@volny.cz

31017

Použiteľné do:
Číslo šarže:
Obsah: 10 kg

3 830001 599619