

SELONTRA

Vysoko účinná požerová návnada vo forme voskových blokov na ničenie škodlivých hlodavcov (myš domová, potkan hnedý a potkan tmavý).

Typ prípravku: 14 – Rodenticídy (Prípravky na reguláciu živočíšnych škodcov)

Účinná látka: Cholecalciferol 0.075% w/w

Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

Obsahuje horké činidlo a farbivo.

Číslo autorizácie: SK20-017

Číslo šarže: uvedené na obale

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch

Držiteľ autorizácie: BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Balenie: Do 10 kg PP/HDPE/PET/PE/LDPE vedro s opakovateľne uzatvárateľným vrchnákom
Do 10 kg PP/HDPE/PET/PE/LDPE lemovaná opakovateľne uzatvárateľná nádoba ako téglík, plechovka alebo lepenkový kartón, ako aj lakovaná plechovka.

Naplnené PP/PE/LDPE návnadové krabičky balené do 10 kg PP/PET/PE opakovateľne uzatvárateľných nádob alebo opakovateľne uzatvárateľných lepenkových kartónov.

Klasifikácia prípravku:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Informácie o použití prípravku:

SELONTRA je návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

Každá návnada má hmotnosť 20 g a je potiahnutá perforovaným polyolefínovým filmom. Neodstraňujte ani neotvárajte film obsahujúci návnadu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1, Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory

Dávkovanie:

20-40 g návnady (1-2 jednotky) na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 1-2 metre.

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať.

Veľkosť balenia: 10 kg

Pokyny pre aplikáciu:

Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, a to za predpokladu, že je umiestnená dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-2 dni po prvom umiestnení a nahradte spotrebovanú návnadu. Ak je úplne spotrebovaná, na tomto mieste nahradte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo najkratšom čase. Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, deratizačné staničky sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní návnad každých 7 dní, kým je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v ktoromkoľvek okamihu použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrovanie môže viesť k suboptimálnym výsledkom.

Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt.

Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

2, Potkany – profesionáli – vnútorné priestory

Dávkovanie:

100-140 g návnady (5-7 jednotiek) na deratizačnú staničku v 10 metrovej vzdialenosti od seba.

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať.

Veľkosť balenia: 10 kg

Pokyny pre aplikáciu:

Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, za predpokladu, že je umiestnená dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-2 dni po prvom umiestnení a nahradte spotrebovanú návnadu. Ak je úplne spotrebovaná, na tomto mieste nahradte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo najkratšom čase. Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, deratizačné staničky sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní návnad každých 7 dní, kým je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v ktoromkoľvek okamihu použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrovanie môže viesť k suboptimálnym výsledkom.

Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt.

Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

3, Myši, potkany – profesionáli – vonku okolo budov

Dávkovanie:

Myši: 20-40 g návnady (1-2 jednotky) na deratizačnú staničku každé 1-2 metre

Potkany: 100-140 g návnady (5-7 jednotiek) na deratizačnú staničku každých 10 metrov

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať.

Veľkosť balenia: 10 kg

Pokyny pre aplikáciu:

Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, za predpokladu, že je umiestnená dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-2 dni po prvom umiestnení a nahradte spotrebovanú návnadu. Ak je návnada úplne spotrebovaná, na tomto mieste nahradte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo najkratšom čase. Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, deratizačné staničky sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní návnad každých 7 dní, je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v ktoromkoľvek okamihu použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrovanie môže viesť k suboptimálnym výsledkom.

Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt.

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď). Návnady umiestnite tak, aby neboli vystavené záplavám.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo ku kontaktu s vodou.

4, Myši, potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Dávkovanie:

Myši: 20-40 g návnady (1-2 jednotky) na deratizačnú staničku každé 1-2 metre

Potkany: 100-140 g návnady (5-7 jednotiek) na deratizačnú staničku každých 10 metrov

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať.

Rovnaké aplikačné dávky sa používajú pre trvalé návnady.

Veľkosť balenia: 10 kg

Pokyny pre aplikáciu:

Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, za predpokladu, že je umiestnená dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-2 dni po prvom umiestnení a nahradte spotrebovanú návnadu. Ak je návnada úplne spotrebovaná, na tomto mieste nahradte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo najkratšom čase. Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, deratizačné staničky sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní návnad každých 7 dní, kým je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v ktoromkoľvek okamihu použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrovanie môže viesť k suboptimálnym výsledkom.

Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt.

Trvalé návnady: ak je to možné, odporúča sa skontrolovať ošetrovanú oblasť aspoň každé 4 týždne, aby sa predišlo vzniku rezistencie.

Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Ak je to možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Tento výrobok sa môže používať len za výnimočných okolností, keď sa nechemický kontrolný postup a konvenčné formulácie návnad považujú za neúčinné.

Stratégia použitia trvalých návnad sa pravidelne prehodnocuje v kontexte integrovanej ochrany proti škodcom (IPM) a posudzovania rizika opätovného zamorenia.

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

5, Myši, potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Dávkovanie:

Myši: 20-40 g návnady (1-2 jednotky) na deratizačnú staničku každé 1-2 metre

Potkany: 100-140 g návnady (5-7 jednotiek) na deratizačnú staničku každých 10 metrov

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať.

Veľkosť balenia: 10 kg

Pokyny pre aplikáciu:

Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, za predpokladu, že je umiestnená dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-2 dni po prvom umiestnení a nahradte spotrebovanú návnadu. Ak je návnada úplne spotrebovaná, na tomto mieste nahradte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo najkratšom čase. Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, deratizačné staničky sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní návnad každých 7 dní, kým je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v ktoromkoľvek okamihu použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrovanie môže viesť k suboptimálnym výsledkom.

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Návnady umiestnite tak, aby neboli vystavené záplavám.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Na vonkajšie použitie musia byť návnady zakryté a umiestnené na strategických miestach, aby sa minimalizovala expozícia necieľovým druhom.

Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt.

Trvalé návnady: ak je to možné, odporúča sa skontrolovať ošetrovanú oblasť aspoň každé 4 týždne, aby sa predišlo vzniku rezistencie.

Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Ak je to možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov .

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte tento produkt priamo do brlohov.

Trvalé návnady sa môžu používať len za výnimočných okolností, keď sa nechemický kontrolný postup a konvenčné formulácie návnad považujú za neúčinné.

-Stratégia použitia trvalých návnad sa pravidelne prehodnocuje v kontexte integrovanej ochrany proti škodcom (IPM) a posudzovania rizika opätovného zamorenia.

Všeobecné pokyny pre aplikáciu:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Použite hustejšie návnady a maximálny počet jednotiek návnady, kdekoľvek boli potkany alebo myši pozorované. Vyvarujte sa nedostatočného použitia návnad a postupujte podľa odporúčaní na etikete pre dávkovanie na návnadové body a dodržujte frekvenciu návnadových bodov.

Pri ľahšom zamorení použite menšiu hustotu návnadových bodov.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad).

Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Pokúste sa vytvoriť bariéru návnadových bodov medzi obytnými a kŕmnymi oblasťami.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Ak je to možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť.

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, zvážte použitie iného rodenticídu s rozdielnym mechanizmom účinku. Takisto zvážte použitie pascí ako alternatívne riešenie.

LEN PROFESIONÁLI

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (napr. zapchať otvory, pokiaľ je to možné odstráňte potenciálne jedlo a pitie) na zlepšenie príjmu produktu a zníženie možnosti reinvázie.

Staničky s návnadou by mali byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, miesta hniezdenia, kŕmne žľaby, diery, brlohy atď.)

Na konci aplikácie odstráňte zostávajúce návnady alebo staničky s návnadami.

LEN VYŠKOLENÍ PROFESIONÁLI

Použite nižšiu hustotu návnadových bodov pri ľahšom zamorení alebo pri použití trvalých návnad vyškolenými profesionálmi

Staničky s návnadou by mali byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, miesta hniezdenia, kŕmne žľaby, diery, brlohy atď.)

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 2 až 5 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

Staničky s návnadou musia byť označené nasledujúcimi informáciami:

- produkt nepremiestňujte ani neotvárajte
- obsahuje rodenticíd
- názov produktu alebo autorizačné číslo
- cholecalciferol
- v prípade nehody zavolajte toxikologické centrum
- nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Pri práci používajte chemický ochranný oblek, zásteru, ochranné čičmy, ochranné okuliare s bočnými štítmami a vhodné ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.

Pri správnom skladovaní a manipulácii nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. Ak sú počas kontroly nájdené mŕtve alebo zdochynajúce myši alebo potkany, je potrebné ich okamžite odstrániť, aby sa predišlo druhotnej otrave. Nepoužívajte vonku – návnadové body by mali byť zakryté alebo použiť debny s návnadou. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred prestávkami a na konci pracovnej zmeny si dôkladne umyte ruky a/alebo tvár. Prípravok používajte tak, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody, krmív a miest, kde sa s potravinami pracuje. Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov.

Prípravok uchovávajte mimo dosahu tepla. Chráňte pred vlhkosťou. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

Ochrana proti požiaru:

Zabráňte tvorbe prachu. Používajte ochranný odev. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte dymy. Pri vystavení ohni ochladzujte nádoby striekaním vody. Oddelene zachyťte vodu kontaminovanú pri hasení, nenechajte ju odtiecť do systému kanalizácie alebo odpadových vôd. Zvyšky po požiaru a voda kontaminovaná po hasení musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom a rozprašovanou vodou. Vodu použite len na ochladzovanie materiálu v blízkosti požiaru, a to formou jemného zahmlovania, nie silným prúdom, a len tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené zachytenie kontaminovanej vody a zabránené jej preniknutiu do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a zasiahnutiu poľnohospodárskej pôdy.

Pri požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu vznikať toxické splodiny.

Prvá pomoc:

Cholecalciferol spôsobuje hyperkalciémiu. Zaobchádzajte symptomaticky. Liečba zahŕňa diétu s nízkym obsahom vápnika, vysoký príjem solí a tekutín a zabránenie vystaveniu slnečnému žiareniu. Môže pomôcť monitorovanie hladiny vápnika v sére. V niektorých prípadoch môže pomôcť aj kortizón.

Všeobecné pokyny: Ak sa vyskytnú ťažkosti: vyhľadajte lekársku pomoc. Ukážte lekárovi obal, etiketu a/alebo Kartú bezpečnostných údajov.

Po inhalácii: Zabezpečte pokoj a čerstvý vzduch.

Po kontakte s pokožkou: Po kontakte s pokožkou okamžite umyte mydlom a vodou.

Po kontakte s očami: Zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstráňte ich po prvých 5 minútach

a pokračujte vo vyplachovaní očí. Ak sa objaví a pretrváva podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Zvracanie vyvolajte len na odporúčanie Toxikologického informačného centra alebo lekára. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Poznámka pre lekára:

Ošetrovanie: liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie)

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. **02/54 77 41 66**)

Zneškodnenie obalov a zvyškov:

Po ukončení deratizácie je nutné pozbierať a zneškodniť zvyšky návnady, aby sa zabránilo náhodnému požitiu návnady deťmi, domácimi zvieratami alebo necieľovými živočíchmi. Tieto návnady sú považované za toxický odpad a musia byť zbierané v špeciálnej skladovacej miestnosti a následne odstránené a zneškodnené. Pri likvidácii zvyškov a použitých obalov nesmú byť zasiahnuté zdroje spodných vôd a recipienty povrchových vôd. Obaly dajte buď do zberu k recyklácii alebo k likvidácii k spáleniu vo schválenej spaľovni, vybavenej dvojestupňovým spaľovaním s teplotou 1200-1400 °C v druhom stupni a s čistením plyných spodín. Takisto sa spália prípadné zvyšky prípravku po predbežnom zmiešaním s horľavým materiálom (pilinami a pod.).

Uhynuté telá hlodavcov likvidujte podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 spálením (článok 4, odstavec 2, písmeno a) tohto predpisu) alebo prostredníctvom asanačných podnikov.

Skladovanie:

Prípravok sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch v suchých uzamykateľných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a vlhkosťou. Uchovávajte mimo dosahu tepla.

Na skladovanie nepoužívajte miestnosti, v ktorých boli skladované pesticídy. Ich pach by mohol hlodavce odpudzovať.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neotvorených obaloch prípravok zachová plnú biologickú účinnosť po dobu najmenej 3 roky. Pri dodržaní návodu na použitie je prípravok vhodný na doporučený účel. Výrobca však nemôže ručiť za škody, spôsobené neodborným a predpisom nezodpovedajúcim použitím a skladovaním.

BASF ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania alebo nesprávneho použitia.